

Mijn kind reageert anders – hoe komt dat?

SI-onderzoek: hoe verwerkt een kind prikkels?

Soms merk je dat een kind anders reageert dan andere kinderen. Het raakt bijvoorbeeld snel overprikkeld, reageert juist weinig of heeft veel behoefte aan bewegen en prikkels. Je vraagt je misschien af waar dit door komt.

Wanneer is een SI-onderzoek helpend?

Een SI-onderzoek kan helpend zijn wanneer een kind:

- snel overprikkeld raakt of juist weinig reageert;
- sterk reageert op geluiden, licht, aanraking of eten;
- aanraking niet prettig vindt;
- veel behoefte heeft aan bewegen of wiebelen;
- snel afgeleid is;
- moeite heeft met balans of vaak struikelt;
- moeite heeft met fijne motoriek;
- moeite heeft met het plannen en uitvoeren van bewegingen;
- moeite heeft om zijn lichaam goed aan te voelen.

Deze kenmerken kunnen invloed hebben op gedrag, leren en contact met anderen.

Hoe verloopt het SI-onderzoek?

Tijdens het SI-onderzoek kijken we hoe een kind prikkels verwerkt en wat dit betekent in het dagelijks leven. We kijken of een kind snel overprikkeld raakt, juist weinig reageert of extra prikkels nodig heeft.

Ook kijken we hoe dit terug te zien is in gedrag, emoties, aandacht en bewegen.



Om hier een goed beeld van te krijgen, praten we met ouders en soms ook met school. We gebruiken vragenlijsten en kijken naar het kind tijdens spel en beweging. Observaties kunnen plaatsvinden op één van onze locaties. Soms kijken we ook thuis, op school of op de dagbesteding.

Na afloop krijg je een duidelijk verslag met uitleg en praktische tips die je meteen kunt gebruiken in het dagelijks leven.

Meer informatie en aanmelden

Neem contact op met de Centrale Cliënt Administratie Front Office:

046 - 477 52 93

FOjeugdLimburgCCLA@koraal.nl